

NEU bei kreisrundem Haarausfall

EINLADUNG



WEBINAR

LITFULO® als Innovation
in der Alopecia Areata –
zugelassen bereits ab 12 Jahren



Wann:
13.03.2024
18:00 Uhr

Litfulo*
(ritlecitinib)

Pfizer

EINLADUNG



Hier anmelden oder unter
https://dv.tik.cc/litfulo2024_2

MEDAhead Gesellschaft für medizinische
Information m.b.H.

Part of Futuro Publishing Group
Mag.a Helene Hirschl

Tel.: 01/607 02 33-68

E-Mail: h.hirschl@medahead.at

Teilnahme kostenlos!

Anmeldung erforderlich!

Diese Veranstaltung ist nur für
medizinisches Fachpersonal.

Ort: virtuell



DIE EXPERT*INNEN



Prof. Dr.
Tobias W. Fischer
KUK Linz



Prof. Priv.-Doz. Dr.
Johannes Maximilian Griss, PhD,
MedUni Wien



Ao. Univ.-Prof. Dr.
Daisy Kopera
MedUni Graz

Agenda

Beginn: 18:00 Uhr

Moderation: Prof. Dr. Fischer

- 18:00–18:05 Uhr** Begrüßung und einleitende Worte
Prof. Dr. Fischer
- 18:05–18:25 Uhr** Alopecia areata – Aktuelles Verständnis,
Methoden zur Schweregrad-Messung und
Einfluss auf das Patientenleben
Prof. Dr. Kopera
- 18:25–18:45 Uhr** Behandlungsmöglichkeiten bei Alopecia areata
Prof. Dr. Fischer
- 18:45–19:05 Uhr** Was verändert Litfulo® (Ritlecitinib)
in der Behandlung der Alopecia areata
Prof. Dr. Griss
- 19:05–19:35 Uhr** Diskussion und Erfahrungen aus der Praxis

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8.

Litfulo® 50 mg Hartkapseln. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Hartkapsel enthält Ritlectiniblyosat entsprechend 50 mg Ritlectinib. *Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:* Jede Hartkapsel enthält 21,27 mg Lactose-Monohydrat. **Liste der sonstigen Bestandteile:** *Kapselhülle:* Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Crospovidon, Glyceroldibehenanat; *Kapselhülle:* Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Brillantblau FCF (E133); *Drucktinte:* Schellack, Propylenglycol, konzentrierte Ammoniak-Lösung, Eisen(II, III)-oxid (E172), Kaliumhydroxid. **Anwendungsgebiete:** Litfulo wird angewendet für die Behandlung von schwerer Alopecia areata bei Erwachsenen und Jugendlichen ab einem Alter von 12 Jahren (siehe Abschnitt 5.1 der Fachinformation). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 der Fachinformation genannten sonstigen Bestandteile; aktive, schwerwiegende Infektionen, einschließlich Tuberkulose (TB, siehe Abschnitt 4.4 der Fachinformation); schwere Leberfunktionsstörungen (siehe Abschnitt 4.2 der Fachinformation); Schwangerschaft und Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6 der Fachinformation). **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Immunsuppressiva, Janus-assoziierte Kinase (JAK) Inhibitoren, ATC-Code: L04AF08. **Inhaber der Zulassung:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1015 Bruxelles, Belgien. **Stand der Information:** September 2023. **Rezeptpflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Angaben zu besonderen Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.**

Möchten Sie Pfizer aus anderweitigen Gründen kontaktieren, dann verwenden Sie bitte folgende Kontaktmöglichkeiten:

Möchten Sie eine Nebenwirkung melden, dann wenden Sie sich bitte an AUT.AERreporting@pfizer.com

Medizinische Anfragen richten Sie bitte an Medical.Information@pfizer.com

Anfragen zu Produktreklamationen richten Sie bitte an Reklamation.Austria@pfizer.com

Weitere Informationen zum Datenschutz von Pfizer finden Sie unter <https://privacycenter.pfizer.com/de/hcp-at>

Weitere Informationen zum Datenschutz von MEDahead finden Sie unter <https://medahead-fortbildung.at/datenschutz>

